Chirurgie Orthopédique & Traumatologie

HANCHE

Dr ALAIN

Dr BOSCHER

Dr CHROSCIANY

Dr COSTE

Dr DOTZIS

Dr LOUISIA

Dr MARCZUK

Dr PICOULEAU

Dr VACQUERIE

SECRÉTARIAT PERSONNA

TÉL. VOIR RUBRIQUE "LES CHIRURGIENS"

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

05 55 45 44 33

DU LUNDI AU VENDREDI

8H30 - 12H30 / **14H00 - 18H00**

LE SAMEDI

9H00 - 12H00

Le guide du patient

PSOITIS

PSOITIS

Ceci correspond à une douleur en rapport avec une trop grande tension du tendon du psoas qui est un muscle qui permet de fléchir la hanche. Cette trop grande tension est responsable d'une inflammation (tendinite) et donc de douleur.

Sous contrôle arthroscopique on peut réaliser une section partielle de ce tendon réalisant l'équivalent d'un allongemenet pour supprimer la tension excessif et donc soulager la douleur.

Cette douleur peut s'observer dans les suites de la mise en place d'une prothèse totale de hanche soit parce que l'implant cotyloïdien déborde en avant et vient frotter sur le tendon Cela peut également exister sans débord de l'implant mais uniquement parce que la tension du tendon augmente car la hanche était raide depuis longtemps occasionnant une rétraction du tendon dans une position raccourcie qui devient trop tendue lorsque l'anatomie normale de la hanche est restituée lors de la mise en place de la prothèse.